

ՄԵԾԱՀԱՍԱԿՆԵՐԻ ՖԱՐԻՆԳԻՏԻ ՎԱՐՄԱՆ ԱԼԳՈՐԻԹՄ

ՖԱՐԻՆԳԻՏ ԵՆԹԱԴՐՈՂ ԱՄՏԱՆՇԱՆՆԵՐ՝ ցավ կոկորդում, հազ, գլխացավ, տենդ և ձայնի խռչուտություն

Պացիենտն ունի հետըմպանային կամ հարնչիկային թարախակույտի նշաններ

Այո

Հոսպիտալացնել կամ ուղեգրել քիթ-կոկորդ-ականջաբանի մոտ

Ոչ

Մանրէաբանորեն հաստատված մանրէային վարակ է կամ դրա լուրջ կասկած (**Տենդ-Ցավ** սանդղակով (**FeverPAIN**) նվազագույնը 4 չափանիշի բավարարում)*

Այո

Բուժել պենիցիլինով կամ ամոքսիցիլինով + ցավազրկում

Ոչ

Զգոն հսկողություն

- Ոչ մի հակաբիոտիկ
- Ախտանշանների թեթևացում ցավազրկողների միջոցով
- Վերագնահատում 48-72 ժամ հետո

Այո

Պացիենտի մոտ ախտանշանները լավանում են

Այո

Ավարտել բուժումը

Ոչ

* **Տենդ-Ցավ (FeverPAIN) սանդղակ**

A խմբի ստրեպտոկոկային (GAS) ֆարինգիտի նշաններ.

- Տենդ վերջին 24 ժամվա ընթացքում
- Թարախային քմային նշիկներ
- Այց բժշկին/սկիպը ≤ 3 օրվա ընթացքում
- Քմային նշիկների արտահայտված բորբոքում
- Հապի կամ հարբուխի բացակայություն ≥ 4 չափանիշ -60-65% GAS-ի հավանականություն