



ԵՐԵՎԱՆԻ ՍՈՒՐ ՄԻԶԻՒ ՕՇԽԻ ԿԱՐՄԱՆ ԱԼԳՈՐԻԹՄ

## ՏԻՄԱԿԱՆ ՆՇԱՆՏԵՐ ԵՎ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ

- Այտուց/ցավ  
մաստոհիդ  
(պտկաձև) ելուսի  
շրջանում
  - Ցավ ականջում
  - Դյուրագրովածություն
  - Լողական անցուղուց  
արտադրություն
  - Տենդ

## ՕՏՈՍԿՈՊԻԿ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

- Թմբկաթաղանթի հիպերեմիա
  - Արտափրվածություն
  - Արտադրություն

# ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

**1 Պատկաճն ելուսի շրջանում այսուցի և ցավի դեպքում ուղեգործ հիվանդանոց սուր մաստո- հիփի կասկածի կապակցությամբ:**

2 Յավի  
դեպքում  
տայ զավակողո

### **3 Նշանակել հակաբիոտիկ հետևյալ դեպքերում.**

- առկա են չափավոր կամ ուժգին ականջացավ, օտոսկրպիկ փոփոխություններ, տևում է 48 ժամ և ավելի և մարմնի ջերմաստիճանը բարձր է  $38,5^{\circ}\text{C}$ -ից, թարախային արտադրություն ալյանջից,
  - Երկսողմանի սուր միջին օտիտ մինչև 2 տարեկան երեխաների մոտ,
  - առկա են ռիսկի գործոններ (հմունաբավարարության վիճակ կամ քրոնիկական/ծանր հիվանդություններ):

**4** Այլբոլոր դեպքերում, եթե ցավը տևում է 48 ժամից պակաս, մարմնի ջերմաստիճանը **38,5°C**-ից ցածր է, չկա երկկողմանի բորբոքում (մինչև 2 տարեկան երեխայի մոտ), չկան ռիսկի գործոններ՝ ծնողին առաջարկել հսկել 48 ժամ, ինչից հետո զնահատել վիճակը և կայացնել որոշում՝ հակաբիոտիկ նշանակելու վեռաբերում:

**5** Որպես առաջին  
ընտրություն՝ Նշանակվում  
**է Ամոքսիցիլին 3-7 օր,**  
պայմանավորված հիվանդու-  
թյան ծանրությամբ,  
միա- կամ երկողմանի  
ախտընթացով, արտադրու-  
թյան առկայությամբ:

**6** Եթե երեխան վերջերս ստացել է Ամոբսիցիլին կամ նախկինում հաճախակի է ստացել հակաբիոտիկներ՝ Ամոբսիցի հն+նախուսանատ:

**7** Երկրորդ ընտրություն՝  
ցեֆալոսպորինային խմբի 2-րդ  
և 3-րդ սերնի ռեղամիջոցներ:

**8** Եթե ականչից արտադրություն է գալիս, անհրաժեշտ է օրը մի քանի անգամ այն չորացնել մաքուր բամբակով, հասանելիության դեպքում ուղեգործ քթ-կոկորդ-ականքարանի մոտ խորհրդատվության:

## **9 Բացառել ջրի ներթափանցումն անանջի մեջ:**

## **10** ԱՆԻՐԱԺԵՂՅ Է ԼՎԱՆԱԼ ՔԻԹԸ Ս ԱՊԱՀՈՎԵԼ ԱՎԱՏ ՔԹԱՅԻՆ ՀՆԱՐԴՈՒԹՈՒՆ:

**11** Բացատրել Վտանգի Նշանները (հնարյակոր բարդությունները) և տնային խնամքը:

**12** Վերագնահատում 48 ժամ հետո. Եթե բրեխան չի ստացել հակաբիուսիկ, նշանակել այն, եթե ստացել է և չկա վիճակի լավացում՝ փոխել հակաբիուսիկը կամ ուղեգործը քիթ-կոկորդ- ականջաբասի մոտ խորհրդատվության: